Phòng và ch□a b□nh CRD cho gi□ng Gà Đông T□o

Vi□t b□i Ban Qu□n Tr□
Th□ t□, 31 Tháng 12 2014 10:33 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ năm, 11 Tháng 5 2023 09:35

Trang tr□i **Gà Đông T□o** thu□n ch□ng TâyNguyên24h.com gi□i thi□u m□t s□ đ□c đi□m, bi□n pháp phòng ch□ng và ch□a b□nh CRD cho gi□ng **Gà Đông T□o** nuôi t□i Tây nguyên và các vùng ph□ c□n

Qua th□i gian theo dõi và chăm sóc gà t□i trang tr□i và các khách hàng, Trang tr□i **Gà Đông T□o** Thu□n ch□ng TâyNguyên24h.com chúng tôi nh□n th□y, gi□ng **Gà Đông T□o** khi nuôi t□i khu v□c phía Nam th□□ng m□c ph□i b□nh hô h□p mãn tính (CRD) n□u không bi□t chăm sóc đúng cách. Trang tr□i chúng tôi đ□a ra m□t s□ đ□c đi□m, bi□n pháp phòng ch□ng và ch□a b□nh CRD cho gi□ng **Gà Đông T□o** nh□ sau:

BI□U HI□N M□C B□NH CRD □ GI□NG GÀ ĐÔNG T□O

B□nh CRD □ **Gà Đông T□o** có bi□u hi□n đ□c tr□ng là gà th□ khò khè, s□ng m□t. Đây là m□t b□nh r□t ph□ bi□n xu□t hi□n khi th□i ti□t chuy□n mùa, m□a nhi□u ho□c quá nóng. B□nh xu□t hi□n trên m□i l□a tu□i, đ□c bi□t **Gà Đông T□o** 1-2 tháng tu□i, gà mái và gà tr□ng s□p tr□□ng thành cũng d□ m□c b□nh, gà nuôi nh□t nhi□u không v□ sinh sách s□ cũng d□ m□c b□nh.

Nguyên nhân: B□nh CRD do vi khu□n Mycoplasma gallisepticum gây ra. Mycoplasma s□ng ch□ y□u trong c□ th□ c□a gia c□m và gây b□nh, khi ra kh□i c□ th□ chúng ch□ s□ng đ□□c t□ 1-3 ngày □ trong phân, môi tr□□ng xung quanh, d□ng c□ chăn nuôi, chu□ng tr□i ho□c t□n t□i đ□□c 4-5 ngày □ trong d□ch nh□y. H□u h□t t□t c□ các ch□t sát trùng đ□u có kh□ năng di□t đ□□c vi khu□n Mycoplasma. Nh□ng lo□i thu□c trùng có nhãn hi□u BIO nh□ BIOXIDE, BIODINE, BIOSEPT có tác d□ng t□t tiêu di□t vi khu□n Mycoplasma và các virus, vi khu□n, bào t□ và n□m.

Kh□ năng lây b□nh: B□nh CRD □ gi□ng **Gà Đông T□o** ch□ y□u lây qua đ□□ng hô h□p do ti□p xúc tr□c ti□p gi□a gà b□nh và gà kh□e, do th□c ăn n□□c u□ng, do d□ng c□ chăn nuôi, do ng□□i l□ ti□p xúc v□i trang tr□i có mang m□m b□nh ho□c do không khí có ch□a m□m b□nh. B□nh còn có th□ lây qua tr□ng n□u đàn **Gà Đông T□o** gi□ng b□ b□nh CRD, m□m b□nh truy□n qua tr□ng, khi □p n□ gà con s□ b□ b□nh CRD. B□nh r□t d□ lây lan ra c□ đàn ra khi th□i ti□t thay đ□i, nh□t là vào mùa m□a, khi □m đ□ không khí tăng cao. Khi đàn gà m□c các b□nh khác, s□c đ□ kháng suy gi□m vì nhi□u nguyên nhân khác nhau cũng khi□n đàn gà m□c b□nh.

Bi□u hi□n m□c b□nh CRD: Khi gi□ng **Gà Đông T□o** m□c b□nh CRD s□ có bi□u hi□n hay v□y m□, s□ng m□t, m□t nh□m, □ rũ, m□t ch□y n□□c sùi b□t, n□□c mũi, h□t h□i, th□ khò khè. Gà gi□m ăn, ch□m l□n, gi□m đ□, t□ l□ tr□ng □p n□ th□p, gà con n□ ra y□u và khó phát tri□n.

Gà Đông T□o b□ b□nh C-CRD: Hi□n nay t□i khu v□c phía Nam, **Gà Đông T□o** b□ b□nh CRD ghép v□i khu□n E.coli r□t th□□ng x□y ra, n□u gà b□ CRD ghép v□i E.coli (C – CRD) thì gà th□□ng s□t cao, t□ l□ ch□t có th□ lên đ□n 30%. Đi□u này gây nguy hi□m cho c□ đàn gà. Khi m□c b□nh gà mái đ□ ra tr□ng th□□ng b□ méo mó và v□ tr□ng có nh□ng v□t máu l□m t□m. B□nh này s□ cho k□t qu□ đi□u tr□ kém n□u không ch□n đúng thu□c đ□c tr□. Ki□m tra có th□ th□y: Viêm xu□t huy□t □ đ□□ng hô h□p trên, túi khí dày và đ□c có khi màu vàng nh□t, viêm màng bao quanh gan, viêm màng ngoài tim, viêm ph□i. □ gà mái đ□ th□y viêm □ng d□n tr□ng.

BI□N PHÁP CH□A TR□ VÀ PHÒNG CH□NG B□NH CRD □ GI□NG GÀ ĐÔNG T□O

Cách phòng b□nh: B□nh CRD r□t d□ x□y ra lúc giao mùa ho□c khi th□i ti□t thay đ□i, gia c□m b□ suy gi□m s□c đ□ kháng, vì v□y bi□n pháp phòng b□nh c□n đ□□c th□c hi□n đ□y đ□ các b□□c nh□

sau:
- Chu□ng tr□i ph□i thông thoáng, sát trùng đ□nh k□, sát trùng máy □p th□t t□t.
- B□ sung th□□ng xuyên đ□y đ□ các lo□i vitamin, các ch□t đi□n gi□i nh□m nâng cao s□c đ□ kháng.
- S□ d□ng kháng sinh đ□ phòng b□nh: C□n l□u ý hi□n nay có 3 nhóm kháng sinh có hi□u l□c v□i Mycoplasma đó là nhóm Tetracycline, nhóm Macrolide và nhóm Quinolone. Ng□□i nuôi có th□ tìm mua s□ d□ng các nhóm kháng sinh nh□y c□m trên đ□ phòng b□nh m□i khi th□i ti□t thay đ□i nh□: BIO-TYLODOX PLUS ho□c BIO-TILMICOSIN. Thu□c BIO-TILMICOSIN r□t công hi□u v□i b□nh CRD □ gia c□m. Li□u l□□ng: 1 ml/12,5kg th□ tr□ng ho□c 0,3ml/lít n□□c u□ng, liên t□c trong 3 ngày.
- N□u nghi ng□ b□nh CRD có k□t h□p v□i E.coli, thì s□ d□ng thu□c đ□c tr□ BIO-TYLODOX PLUS cho k□t qu□ r□t công hi□u v□i b□nh CRD k□t h□p E,coli. Ngoài ra c□n s□ d□ng thêm ch□t đi□n gi□i nh□m tăng s□c đ□ kháng cho gia c□m.