

Trang trí [Gà Đông Tào](#) thu nhập chính Tây Nguyên 24h.com giới thiệu một số đặc điểm, biện pháp phòng bệnh và chữa bệnh CRD cho gia cầm [Gà Đông Tào](#) nuôi tại Tây nguyên và các vùng phía bắc

Qua thời gian theo dõi và chăm sóc gà tại trang trí và các khách hàng, Trang trí [Gà Đông Tào](#) Thu nhập

chính Tây Nguyên 24h.com chúng tôi nhận thấy, gia cầm

### [Gà Đông Tào](#)

khi nuôi tại khu vực phía Nam thường mắc phải bệnh hô hấp mãn tính (CRD) nếu không biết chăm sóc đúng cách. Trang trí chúng tôi đưa ra một số đặc điểm, biện pháp phòng bệnh và chữa bệnh CRD cho gia cầm

### [Gà Đông Tào](#)

như sau:

#### **BIỂU HIỆN MẮC BỆNH CRD Ở GIA CẦM GÀ ĐÔNG TÀO**

Bệnh CRD ở [Gà Đông Tào](#) có biểu hiện đầu tiên là gà thở khò khè, sưng mắt. Đây là một bệnh rất phổ biến xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, mùa hè quá nóng. Bệnh xuất hiện trên mặt mũi và tai, đặc biệt

[Gà Đông Tào](#) 1-2 tháng tuổi, gà mái và

gà trống sẽ phát triển thành cũng do mắc bệnh, gà nuôi nhốt nhieu không sinh sản sẽ cũng do mắc bệnh.

Nguyên nhân: Bệnh CRD do vi khuẩn Mycoplasma gallisepticum gây ra. Mycoplasma sống chủ yếu trong cổ họng của gia cầm và gây bệnh, khi ra khỏi cổ họng chúng sẽ sống được từ 1-3 ngày trong phân, môi trường xung quanh, dùng cũi chăn nuôi, chuồng trại hoặc từ từ tiếp xúc 4-5 ngày trong dịch nhầy. Hầu hết tất cả các chất sát trùng đều có khả năng diệt được vi khuẩn Mycoplasma. Nhưng loại thuốc trừ sâu có nhãn hiệu BIO như BIOXIDE, BIODINE, BIOSEPT có tác dụng tốt tiêu diệt vi khuẩn Mycoplasma và các virus, vi khuẩn, bào tử và nấm.

Khả năng lây bệnh: Bệnh CRD ở gia cầm [Gà Đông Tào](#) chủ yếu lây qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp giữa gà bệnh và gà khỏe, do thức ăn nhiễm khuẩn, do dùng cũi chăn nuôi, do người tiếp xúc với trang trí có mang mầm bệnh hoặc do không khí có chứa mầm bệnh. Bệnh còn có thể lây qua trứng nếu đàn

[Gà Đông](#)

### [Tào](#)

giống bệnh

bệnh CRD, mầm bệnh truyền qua trứng, khi ấp nở gà con sẽ mắc bệnh CRD. Bệnh rất dễ lây lan ra cả đàn ra khi thời tiết thay đổi, nhốt là vào mùa hè, khi mật độ không khí tăng cao. Khi đàn gà mắc các bệnh khác, sẽ dễ dàng kháng suy giảm vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng khi đàn gà mắc bệnh.

Biểu hiện mắc bệnh CRD: Khi gia cầm [Gà Đông Tào](#) mắc bệnh CRD sẽ có biểu hiện hay vẩy mắt, sưng mắt, mắt nhắm, rỉ mắt, mắt chảy nước mũi, nước mũi, hắt hơi, thở khò khè. Gà giảm ăn, chậm lớn, giảm đẻ, tỷ lệ trứng nở thấp, gà con nở yếu và khó phát triển.

[Gà Đông Tào](#) mắc bệnh C-CRD: Hiện nay tại khu vực phía Nam, [Gà Đông Tào](#) mắc bệnh CRD ghép với vi khuẩn E.coli rất thường xảy ra, nếu gà mắc CRD ghép với E.coli (C – CRD) thì gà thường sốt cao, tỷ lệ chết có thể lên đến 30%. Điều này gây nguy hiểm cho cả đàn gà. Khi mắc bệnh gà mái đẻ ra trứng thường bị méo mó và trứng có nhoe nhoe vết máu làm mất giá trị. Bệnh này sẽ cho kết quả điều trị kém nếu không chẩn đoán đúng thuốc điều trị. Kiểm tra có thể thấy: Viêm xuất huyết đường hô hấp trên, túi khí dày và đặc có khi màu vàng nhợt, viêm màng bao quanh gan, viêm màng ngoài tim, viêm phổi. Gà mái đẻ thấy viêm đường đẻ trứng.

#### **BIỆN PHÁP CHỮA TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH CRD Ở GIA CẦM GÀ ĐÔNG TÀO**

Cách phòng bệnh: Bệnh CRD rất dễ xảy ra lúc giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi, gia cầm bị suy giảm sức đề kháng, vì vậy biện pháp phòng bệnh cần được thực hiện đầy đủ các biện pháp như

sau:

- Chú ý giữ vệ sinh phòng, sát trùng đồ nhả, sát trùng máy ấp trứng.
- Bổ sung thức ăn xuyên suốt các loại vitamin, các chất điện giải nhằm nâng cao sức đề kháng.
- Sử dụng kháng sinh để phòng bệnh: Cần lưu ý hiện nay có 3 nhóm kháng sinh có hiệu quả với Mycoplasma đó là nhóm Tetracycline, nhóm Macrolide và nhóm Quinolone. Người nuôi có thể tìm mua sử dụng các nhóm kháng sinh này ở các tiệm thuốc phòng bệnh mà khi thời tiết thay đổi như: BIO-TYLODOX PLUS hoặc BIO-TILMICOSIN. Thuốc BIO-TILMICOSIN rất công hiệu với bệnh CRD ở gia cầm. Liều lượng: 1 ml/12,5kg trọng lượng hoặc 0,3ml/lít nước uống, liên tục trong 3 ngày.
- Nếu nghi ngờ bệnh CRD có kết hợp với E.coli, thì sử dụng thuốc để trị BIO-TYLODOX PLUS cho kết quả rất công hiệu với bệnh CRD kết hợp E.coli. Ngoài ra cần sử dụng thêm chất điện giải nhằm tăng sức đề kháng cho gia cầm.